

Tabel 4. Drachtkalender met belangrijke soorten voor honingbijen op het platteland. Een nectarscore 3 betekent dat de bloem goed bevlagen wordt door honingbijen en dat de plant ook veel nectar produceert. Een lagere score betekent dat de plant minder goed bevlagen wordt of minder nectar produceert (Koster 2007; Hoorde et al. 1996). Een + geeft de bloeiperiode aan.

Latijnse naam	Nederlandse naam	Nectar-score (1-3)	Stuifmeel-score (1-3)	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
<i>Crocus biflorus</i>	Crocus	1	2		+	+									
<i>Salix spec.</i>	Wilg	3	3			+	+	+							
<i>Prunus spec.</i>	Pruim/kers	2	2			+	+	+							
<i>Pyrus/malus spec.</i>	Peer/appel	1	1				+	+							
<i>Crucifera spec.</i>	Kruisbloemigen	3	3				+	+	+	+	+	+	+		
<i>Acer spec.</i>	Esdoorn	3	3				+	+							
<i>Taraxacum officinale</i>	Paardenbloem	3	3			+	+	+				+	+		
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Witte paardenkastanje	1	2					+	+						
<i>Crataegus spec.</i>	Meidoorn	1	1					+							
<i>Trifolium repens</i>	Witte klaver	3	3					+	+	+	+	+	+		
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Phacelia	3	3					+	+	+	+	+			
<i>Rosa spec.</i>	Rozen	1	3						+	+	+				
<i>Rhamnus frangula</i>	Vuilboom	2	2					+	+	+	+	+			
<i>Vicia spec.</i>	Wikke	1	1					+	+	+	+				
<i>Trifolium pratense</i>	Rode klaver	1	1					+	+	+	+	+	+		
<i>Centaurea cyanus</i>	Korenbloem	3	3						+	+	+				
<i>Castanea sativa</i>	Tamme kastanje	2	3						+	+					
<i>Papaver rhoeas</i>	Klaproos	1	3					+	+	+	+				
<i>Calendula officinalis</i>	Goudsbloem	2	2					+	+	+	+	+	+		
<i>Asparagus spec.</i>	Asperge	2	2					+	+	+					
<i>Fragaria ananassa</i>	Aardbei	1	2					+	+	+					
<i>Hedera helix</i>	Klimop	3	3									+	+	+	